



Jaarverslag kliniek obstetrie 2021


In 2021 hadden we 2889 klinische partus, een flinke toename ten opzichte van de voorgaande jaren, met name een toename in februari en maart. De toename van het aantal bevalling is in lijn met een landelijke trend, dit lijkt te maken te hebben met de covid pandemie.



Eind 2020 hadden we ons als doel gesteld om de stijgende trend van het aantal kunstverlossingen (zowel vaginale kunstverlossingen als het aantal sectio's) een halt toe te roepen en hebben hiervoor



een werkgroep opgericht met als strijdkreet 'maximaal vaginaal'. Het heeft gewerkt, in totaal hadden we een toename in het aantal vrouwen dat spontaan vaginaal beviel.

Onze specifieke doelgroep was de NTSV groep (nulliparous, term, singleton, vertex position). De resultaten staan in de grafiek hieronder weergegeven. We hebben zowel een daling in het percentage vaginale kunstverlossingen als in de secundaire sectio groep. Hiermee een mooie stijging van het percentage vrouwen dat spontaan vaginaal bevalt van haar eerste kind. Hiertoe hebben we enkele veranderingen doorgevoerd waaronder de oxytocine bijstimulatie schema's, meer draadloze CTG apparaten voor meer bewegingsvrijheid, meer geduld tijdens het persen en het vullen van de foley ballon catheters ter inleiding met meer cc's aan vocht. Het percentage primaire sectio's in deze patiëntengroep is nog steeds erg laag. Alles bij elkaar een mooi resultaat waar we trots op zijn.




Stuitligging

Wanneer er sprake is van een stuitligging is de meest gekozen manier van bevallen een primaire sectio, dit percentage is nagenoeg gelijk ten opzichte van vorige jaren, op 2020 na. Toen hadden we meer primaire sectio's en minder secundaire op deze indicatie. Het percentage spontaan eindigende bevallingen in deze groep daalt. Dit is ook te zien in de grafiek eronder, deze geeft de modus partus weer bij de in opzet vaginale stuitbevallingen. Door de kleine aantallen is het lastig om hier een trend in te ontdekken.



Meerlingen

In 2021 hadden we 60 bevallingen bij vrouwen zwanger van een meerling, in alle gevallen betrof dit een gemelli. Wanneer de eerste zich in hoofdligging presenteert, wordt in de regel een vaginale baring nagestreefd. In 2021 zijn er meer vrouwen vaginaal bevallen tov de voorgaande twee jaren. Het betreft per groep kleine aantallen, een trend hierin is lastig te herkennen.




Fluxus (klopt niet met 100%, nog navragen Narcis)

	percentage
0-999cc	90
1000-1499cc	4
1500-1999cc	3
2000-2499cc	1
2500-2999cc	0
3000-3499cc	0
>3500cc	0


Start baring

Het grootste deel van onze klinische bevallingen start met een inleiding, namelijk 47%. We hanteren hiervoor indicaties die worden aangehouden ook door de NVOG. We zijn hier zeker wel kritisch naar gaan kijken en bespreken de inleidingsindicatie 2x/week.



Pijnstilling

Indien een patiënte een wens tot pijnstilling heeft binnen ons ziekenhuis wordt zij gecounseld over de opties epidurale anaesthesie vs remifentanil. Epidurale anaesthesie is de meest gebruikte vorm van pijnstilling. De remifentanil is ingevoerd in juni 2020 en wordt inmiddels gezien als een heel mooi alternatief voor pethidine en soms als overbrugging tot de epiduraal als de anaesthesist druk is met meerdere patiënten van ons of met andere spoedingrepen.



Perineum letsel

Sinds een jaar is er specifieke training geweest op het toepassen van de Noorse handgreep. We zien een mooie stijging in het percentage vrouwen dat een gaaf perineum overhoudt na de bevalling. Een mooi resultaat!

